




# PROTOCOLES THERAPEUTIQUES SYNDROME CORONARIEN AIGU SANS SUS-DECALAGE DU SEGMENT ST

VERSION :  
V2.2

DATE :  
23/03/2017

## Début douleur-prise en charge médicale (SAMU/Urgentistes)



### Autres traitements et recommandations

**Bétabloquant** : sauf si âge >70 ans et FEVG non connue, FC > 110, PA < 120, Killip > 3, angor spastique ou prise de cocaïne

**Inhibiteurs de pompe à protons** : selon estimation du risque hémorragique

**Patients sous AVK** : pas d'HNF si INR > 2.5

**Patients sous anticoagulant oral non AVK** : pas d'arrêt, selon délai/dernière prise adjoindre **ENOXAPARINE** (Lovenox®) 0.5 mg/Kg ou HNF 60 UI/Kg

**FA et SCA non ST+** :

- Si coronarographie : poursuite anticoagulant oral + **ASPIRINE** (Aspegic®) 75mg/j et/ou **CLOPIDOGREL** (Plavix®) 75mg/j (fonction HAS bled)
- Si traitement médical seul : poursuite anticoagulant oral + **ASPIRINE** (Aspegic®) 75mg/j ou **CLOPIDOGREL** (Plavix®) 75mg/j