



GUIDE D'ANTIBIOTHERAPIE HORS SEPSIS

VERSION : V1.4

ECRITURE :
Dr MF LUTZ – Dr C. FAYOLLE

RELECTURE :
Pr E. BOTELHO-NEVERS –
Pr A. VIALON

DATE : 09/01/2018

PATHOLOGIE IATROGENE

- **Nécessité d'adapter l'antibiothérapie à écologie bactérienne du patient si connue ou suspectée (BPCO...)**
- **Nécessité d'adaptation de certains anti infectieux aux paramètres physiologiques : fonction rénale, grossesse (cf CRAT)...**
- **Dans le cas d'un sepsis : Cf. protocole thérapeutique du SEPSIS ADULTE**

Situation initiale	Germe(s) probable(s)	Antibiothérapie	Durée
Veinite simple		Pansement alcoolisé	
Veinite compliquée (lymphangite et/ou abcès)	Cocci Gram +	Antibiothérapie après hémoculture pour ne pas méconnaître une bactériémie voire une thrombophlébite suppurée. Oxacilline 1g/8h IV ou Clindamycine hydrate <i>Si allergie vraie : Zyvoxid 600mg /12h</i>	10j - Relais PO Clindamycine hydrate ou Pristinamycine 10j